SUISAG-Ratira

3’000 g

Fertigköder | Appât

Ködergranulat zur Bekämpfung von Mäusen & Ratten

Appât granulé prêt à l’emploi pour la lutte contre les souris & les rats

WIRKUNGSWEISE

Blutgerinnungshemmer der zweiten Generation, welcher Ratten in der Regel schon nach einmaliger Köderaufnahme innerhalb weniger Tage abtötet. Eine wiederholte Aufnahme potenziert jedoch die Wirkung. Aufgrund ihrer verzögerten Wirksamkeit wirken gerinnungshemmende Rodentizide (Antikoagulanzien) 4 bis 10 Tage nach der Aufnahme.
Dadurch kommt es speziell bei Ratten zu keiner Warnung der Artgenossen, keine Köderscheu. Enthält Farb- und Bitterstoff gegen versehentliche Aufnahme.

MODE D’ACTION

Anticoagulant de deuxième génération qui tue les rats généralement en quelques jours seulement après une seule ingestion. Une ingestion répétée multiplie toutefois l’efficacité. En raison de leur efficacité retardée, les rodenticides anticoagulants agissent 4 à 10 jours après leur absorption.
Chez les rats en particulier, cela permet qu’ils n’avertissent pas leurs congénères et ne refusent pas l’appât. Contient un colorant et un amérisant pour éviter une ingestion accidentelle.

Zulassungsnummer/Numéro d’homologation: CH-2023-0026

Wirkstoff / Substance active: Difenacoum 0,05 g/kg (0,005 %)

Notfallauskunft bei Vergiftungen: Toxikologisches Informationszentrum Zürich, Tel.: 145 oder 044 251 51 51
En cas d’urgence: Centre Suisse d’information toxicologique, tél: 145 ou 044 251 51 51

UFI 89W4-U3K3-XY17-203R

Authorisation Holder: HENTSCHKE & SAWATZKI KG, Leinestrasse, 24539 Neumünster Deutschland

SUISAG

Farm AnimalShop

SUISAG-Ratira

Gebrauchsfertiger Ködergranulat zur Bekämpfung von Mäusen und Ratten.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Nur zur Schädlingsbekämpfung nach Gebrauchsanleitung. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Bei Gebrauch des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. Verschlucken kann zu schwerwiegenden Gesundheitsschäden führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Anwendung des Produkts sowie bei möglicher Entsorgung von Kadavern Chemikalienschutzhandschuhe (EN 374, Kat III) aus Nitril (0,12 mm), z. B. Touch N Tuff (Ansell) tragen. Gefährlich für Wildtiere. Nach Abschluss der Bekämpfung nicht gefressene Köder einsammeln und entsorgen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Vor dem Gebrauch alle Produktinformationen auf Etiketten und die detaillierten Anwendungshinweise in der Produktbeilagen lesen. Nur für die berufsmässige Verwendung.

Anwendungsbereiche: Verwendung für geschulte, berufliche Verwender mit und ohne Fachbewilligung (Landwirte) innerhalb und im unmittelbaren Aussenbereich von Gebäuden zur Bekämpfung der Hausmaus, Wanderratte, Hausratte. Für berufliche Verwender mit Fachbewilligung im Aussenbereich auf offenem Gelände, in Mülldeponien zur Bekämpfung der Wanderratte, Hausratte und in der Kanalisation zur Bekämpfung der Wanderratte.

Aufwandmenge: Wander- u. Hausratten: Je nach Stärke des Befalls bis zu 200 g pro Köderstelle auslegen. Bei grosser Populationsdichte Köderstellennetz nach Bedarf verdichten.

Hausmäuse: Möglichst viele Einzelportionen anbieten, max. 50 g pro Köderstelle.

Die Ködergranulate an vermuteten oder bekannten Laufwegen und bevorzugten Befallsstellen, witterungsgeschützt, in manipulationssicheren Köderstationen auslegen. Ködermenge laufend kontrollieren und so lange nachlegen, bis keine Annahme mehr erfolgt. Zur Mäusebekämpfung werden die Köder im Abstand von 5 m und zur Rattenbekämpfung im Abstand von etwa 10 m ausgelegt. Bei starkem Befall ist es empfehlenswert den Abstand zwischen den Ködern auf bis zu 2 m, bei Ratten auf bis zu 5 m zu verkleinern.

Unzugänglich für Kinder, Vögel, Nutztiere und andere Nicht-Zieltiere platzieren. Köder so anbringen, dass sie nicht mit Wasser (z. B. an Wasserleitsystemen, Gewässern) in Kontakt kommen, überschwemmt oder weggespült werden. Köderstationen gegen Verschleppen sichern. Das Produkt nicht zur Pulsbeköderung verwenden.

SUISAG-Ratira

Appât granulé prêt à l'emploi pour la lutte contre les souris et les rats.

MESURES DE PRÉCAUTION

Exclusivement pour la lutte contre les nuisibles conformément au mode d'emploi. Éviter tout contact inutile avec le produit. Ne pas boire, manger ou fumer pendant l'utilisation du produit. L'ingestion peut avoir de graves conséquences sur la santé. Tenir hors de portée des enfants. Pour l'application du produit et l'éventuelle élimination de cadavres, porter des gants de protection contre les produits chimiques (EN 374, cat. III) en nitrile (0,12 mm), p. ex. les gants Touch N Tuff. Dangereux pour le gibier. Après la lutte, ramasser les appâts non ingérés et les éliminer.

MODE D'EMPLOI

Avant utilisation, lire toutes les informations sur le produit figurant sur les étiquettes ainsi que les consignes détaillées d'application dans les informations jointes au produit. Réservé exclusivement à un usage professionnel.

Domaines d'application: Utilisation par des utilisateurs professionnels formés avec ou sans permis correspondant (agriculteurs) à l'intérieur ou dans l'environnement extérieur proche de bâtiments pour la lutte contre la souris domestique, le rat brun et le rat domestique. Pour utilisateurs professionnels avec permis en extérieur, sur terrain ouvert, dans les décharges pour lutter contre le rat brun, le rat domestique et dans les canalisations pour lutter contre le rat brun.

Dosage: Rats bruns et domestiques : placer jusqu'à 200 g d'appâts par point d'appâtage en fonction de l'infestation. En cas de forte présence, densifier si nécessaire le réseau de point d'appâtage.

Souris domestiques : positionner une grande quantité de portions individuelles, 50 g max. par point d'appâtage.

Placer les appâts sur les passages supposés ou connus et sur les lieux les plus infestés, à l'abri du mauvais temps, dans des caisses d'appât inviolables. Contrôler régulièrement la quantité d'appâts et refaire l'appoint jusqu'à ce qu'ils ne soient plus mangés. Pour lutter contre les souris, les appâts sont placés environ tous les 5 mètres et pour lutter contre les rats environ tous les 10 mètres. En cas de forte infestation, nous vous recommandons de réduire la distance entre les appâts à 2 mètres pour les souris ou 5 mètres pour les rats.

Positionner à un endroit non accessible pour les enfants, les oiseaux, le bétail et les autres animaux non visés par la mesure. Installer les appâts de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec de l'eau (près de systèmes avec circulation d'eau, points d'eau, etc.), ne soient pas inondés ou emportés par l'eau. Sécuriser les caisses d'appâts pour les empêcher de bouger. Ne pas utiliser le produit pour une mise en place pulsée.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

H373 Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe (Blut) schädigen.

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

GEFAHR

P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P308 Bei Exposition oder falls betroffen:
P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt in Behälter und
P501 nicht gefressene Köder dem Sonderabfall entsorgen.

ERSTE HILFE MASSNAHMEN

Nach Hautkontakt mit Wasser und Seife waschen. Nach Verschlucken Arzt aufsuchen und Verpackung oder Etikette bereithalten. Hinweis für Ärzte: Difenacoum ist ein indirektes Antikoagulans. Antidot ist Vitamin K1 (Phytomenadion). Difenacoum kann verzögert wirken.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Die Verpackung verschlossen halten und nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Produkt unzugänglich für Kinder, Vögel, Haustiere und Nutztiere aufbewahren. Von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Die Haltbarkeit beträgt 36 Monate. Hautkontakt vermeiden, wenn Köderreste entsorgt werden. Inhalt in Behälter und nicht gefressene Köder dem Sonderabfall zuführen. Nagetiere können Krankheiten übertragen (z. B. Leptospirose). Tote Nagetiere nicht mit blossen Händen berühren. Bei der Entsorgung geeignete Schutzhandschuhe tragen oder Werkzeuge, wie etwa Zangen, verwenden. Tote Tiere in der lokalen Tierkadaversammelstelle oder mit dem Siedlungsabfall entsorgen.

MENTIONS DE DANGER ET DE SÉCURITÉ

H360D Peut nuire au foetus.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les dispositions de sécurité.

DANGER

P260 Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.

P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

P308 En cas d'exposition prouvée ou suspectée:
P313 consulter un médecin.

P405 Garder sous clef. Éliminer le contenu dans le récipient
P501 et les appâts non ingérés avec les déchets spéciaux.

PREMIERS SECOURS

Laver à l'eau et au savon après contact cutané. Consulter le médecin en cas d'ingestion en apportant l'emballage ou l'étiquette. Remarque à l'attention des médecins: le difénacoum est un anticoagulant indirect. Son antidote est la vitamine K1 (phytoménadione). Le difénacoum peut avoir un effet retardé.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

Stocker dans un endroit sec, frais et bien aéré. Garder l'emballage fermé et ne pas l'exposer directement aux rayons du soleil. Conserver le produit à un endroit inaccessible pour les enfants, les oiseaux, les animaux domestiques et le bétail. Tenir à l'écart des denrées alimentaires, boissons et fourrages. La durée de conservation est de 36 mois. Éviter tout contact cutané pendant l'élimination des restes d'appât. Éliminer le contenu dans le récipient et les appâts non ingérés avec les déchets spéciaux.
Les rongeurs peuvent transmettre des maladies (leptospirose p. ex.). Ne pas toucher les rongeurs morts à mains nues. Pour l'élimination, porter des gants de protection adaptés ou utiliser des outils tels que pinces. Éliminer les animaux morts dans le centre local de collecte de cadavres animaux ou avec les déchets urbains.

SUISAG

Farm AnimalShop