

WIRKUNGSSPEKTRUM

Larvicide D ist ein hochwirksames Spezialprodukt zur Bekämpfung der Fliegenmaden in Mist, Gülle oder Einstreu. **Larvicide D** hemmt das Wachstum der Fliegenlarven, indem es die Häutung der Larven beeinflusst, so daß diese absterben. Der gewünschte Behandlungserfolg wird daher erst nach 2-3 Wochen sichtbar.

Larvicide D bekämpft die Fliegen schon im Larvenstadium, so daß sich große Fliegenpopulationen erst gar nicht entwickeln können. **Larvicide D** vernichtet die Larven der Stallfliege, aber auch aller anderen Fliegenarten. Es hat keine Wirkung gegen ausgewachsene Fliegen. Für einen umfassenden Behandlungserfolg ist die gleichzeitige Anwendung eines flüssigen Fliegenbekämpfungsmittels erforderlich. Hierzu empfehlen wir unsere Produkte **Rapido**, **Welitan** oder **Zidex**.

ANWENDUNGSBEREICHE

Larvicide D eignet sich für den Einsatz in Geflügel-, Schweine-, Kälber- und Rinderställen.

Larvicide D ist ein wasserlösliches Pulver, das gegossen oder gespritzt werden kann, aber auch im Streuverfahren ausgebracht wird. Alle Fliegenbrutplätze müssen gründlich behandelt werden, wobei die Tiere im Stall verbleiben können.

WIRKSTOFF

Diflubenzuron, Tetramethrin, Geraniol

ANWENDUNG/DOSIERUNG

• Anwendung im Spritz- oder Gießverfahren:

250 g (ca. 12 Meßlöffel) **Larvicide D** in 25 Liter Wasser gut verrühren und mittels Gießkanne oder einer Rückenspritze auf der Mistfläche verteilen. 250 g reichen für ca. 50 m² Mistfläche.

Mit der ersten Behandlung sollte etwa 5 Tage nach dem Ausmisten begonnen werden. Bei nicht geleerten Güllekanälen oder Kotgruben kann die Behandlung immer erfolgen. Die Behandlung sollte alle 14 Tage wiederholt werden. Behandelt werden: Spaltenböden, Randzonen von Liege- und Laufflächen, Güllekanäle und Schwimmschichten der Gülle.

• Anwendung im Streuverfahren:

Die von Fliegenmaden befallenen Stellen in der Einstreu/Tiefstreu mit 15 g/m² **Larvicide D** bestreuen.

GEBINDEGRÖSSEN

750 g und 3000 g Pulverkonzentrat

ERSTE HILFE: Allg. Hinweise: Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mind. 48 Std nach Unfall. Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen. Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lid 10 - 15 min mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt aufsuchen.

Gegenmittel: symptomatische Behandlung

HINWEISE: Tiere, Personen, Futter- und Lebensmittel dürfen nicht berührt werden. Nicht anwenden in Ställen mit kranken oder neugeborenen Tieren. Altbestände und Reste nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren, sondern Sonderabfall-/Problemstoffsammlerstellen übergeben. Leere Verpackungen nicht wieder verwenden, sondern wie beschrieben entsorgen. Eine Haftung in Zusammenhang mit der Produkthanwendung können wir nicht übernehmen, da sie außerhalb unseres Einflusses liegt.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

1