

WIRKUNGSSPEKTRUM

Rapido quick ist ein mit Wasser mischbares Granulat für eine zuverlässige Fliegenkontrolle im landwirtschaftlichen Umfeld. Nach Aufnahme durch die Fliege erfolgt ein schneller Wirkungseintritt. Resistenzen sind nicht bekannt. Die Wirkung hält bis zu 4 Wochen an. Das Produkt ist farb- und geruchlos. Für bis zu 200 m² Stallgrundfläche.

Rapido quick ist zugelassen als Streichmittel gegen Haus- und Stubenfliegen. Die Verwendung erfolgt durch professionelle bzw. berufliche Verwender.

ANWENDUNGSBEREICHE

Nur Innenanwendung. Verwendung in Stallungen, Tierbehausungen und überdachten Abfallentsorgungseinrichtungen (Tierabfälle/ Tierkadaver).

ANWENDUNG/DOSIERUNG

Streichen (auf Karton-Zuschnitte zum Aufhängen). Für eine Stallgrundfläche von 200 m²: 500 g Köder mit bis zu 400 ml warmen Wasser mischen und auf eine 4 m² große Oberfläche, wie Karton-Zuschnitte, auftragen. Diese Zuschnitte in Bereichen aufhängen, in denen häufig Fliegen vorkommen. Eine erneute Anwendung kann nach mindestens 28 Tagen erfolgen, sollte aber nicht mehr als 5 mal innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten erfolgen.

WIRKSTOFF

103,1 g/kg Imidacloprid / Lockstoff 1 g/kg Muscalure (cis-tricos-9-ene)

GEBINDEGRÖSSEN

500 g wasserlösliches Granulat

ERSTE HILFE

ALLGEMEINE HINWEISE: Aus dem Gefahrenbereich begeben. Das Opfer in stabile Position bringen und transportieren (seitlich liegen). Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen und sicher entsorgen. **BEI HAUTKONTAKT:** Mit reichlich Seife und Wasser gründlich abwaschen. Wenn die Symptome bestehen bleiben, Arzt anrufen. **BEI AUGENKONTAKT:** Sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, mindestens 15 Minuten lang spülen. Nach den ersten 5 Minuten Kontaktlinsen entfernen – falls vorhanden - und weiter spülen. Bei anhaltender Reizung ärztliche Hilfe aufsuchen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. Nicht trinken oder Erbrechen herbeiführen. Rufen Sie sofort einen Arzt oder eine Giftnotrufzentrale an. **BEHANDLUNG:** Symptomatisch behandeln. **ZU ÜBERWACHEN:** Atem und Herzfunktionen. Es gibt kein spezifisches Gegenmittel.

HINWEISE

Tiere, Personen, Futter- und Lebensmittel dürfen nicht berührt werden. Nicht anwenden in Ställen mit kranken oder neugeborenen Tieren. Altbestände und Reste nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren, sondern Sonderabfall-/Problemstoffsammlerstellen übergeben. Leere Verpackungen nicht wiederverwenden, sondern wie beschrieben entsorgen. Eine Haftung in Zusammenhang mit der Produkthanwendung können wir nicht übernehmen, da sie außerhalb unseres Einflusses liegt.