



Rapido quick

Spectre d'action

Rapido quick est un produit en granulés à mélanger avec de l'eau pour un contrôle rapide et durable des mouches dans le domaine de l'agriculture. Il agit efficacement par contact et ingestion contre toutes les espèces de mouches. L'efficacité dure jusqu'à 4 semaines et la quantité est suffisante pour une surface d'étable jusqu'à 300 m².

Champs d'application

Convient pour les étables pour animaux de tout type

Substance active

100 g/kg Imidaclopride

Utilisation / Dosage

Avant l'utilisation, nettoyer les surfaces poussiéreuses et sales. La poussière et la saleté altèrent considérablement l'efficacité de la lutte. Pour une surface d'étable d'environ 150 m², délayer 250 g de concentré avec 2l d'eau. Epandre la solution à l'aide d'un pulvérisateur à dos à faible pression sur un maximum d'endroits possibles. Pulvériser surtout les endroits appréciés par les mouches (par exemple parois, poteaux et rebords de fenêtres). Il suffit de traiter environ 65% de la surface du mur.

L'effet apparaît dans les 30 minutes. Lors de l'épandage et pendant les prochaines 24 heures, veiller à bien aérer l'étable. Fréquence de l'utilisation: habituellement toutes les 3-4 semaines, mais si nécessaire plus fréquemment. Le nettoyage peut se faire à l'aide d'un nettoyant universel légèrement alcalin.

Taille d'emballage

Emballage = 500 g granulés concentrés

Premiers secours

Instructions générales: Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident. Après inhalation: donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles. Après contact avec la peau: laver immédiatement à l'eau et au savon. Après contact avec les yeux: rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 10 - 15 minutes en gardant la paupière ouverte, consulter un médecin.

En cas d'ingestion: appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. Rincer la bouche. Provoquer le vomissement seulement si : 1^e Le patient est pleinement conscient. 2^e Les traitements médicaux ne sont pas disponibles dans l'immédiat. 3^e Une quantité importante a été ingérée. 4^e L'ingestion n'a pas eu lieu depuis plus d'une heure (les vomissements ne doivent pas passer dans la trachée).

Traitement adéquat: traitement symptomatique.

Indications

Les animaux, personnes, produits alimentaires et aliments pour animaux ne doivent pas entrer en contact avec le produit. Ne pas l'utiliser dans des étables avec animaux malades ou nouveau-nés. Ne pas jeter les stocks périmés et restes avec les déchets ménagers. Ne pas verser les restes dans l'évier ou le WC, mais les remettre à la collecte de déchets spéciaux/matières à risque. Ne pas réutiliser des emballages vides, mais les éliminer comme indiqué ci-dessus. Nous déclinons toute responsabilité en rapport avec l'utilisation du produit qui n'est pas soumise à notre influence.

Utiliser les biocides de façon sûre. Avant l'utilisation toujours lire le marquage et l'information sur le produit. Vous trouverez des indications supplémentaires dans la fiche de données de sécurité de Rapido quick. Il faut tenir compte des indications mentionnées. Cet aide-mémoire a été réalisé selon nos meilleures connaissances et expériences. Nous communiquons ces informations sans garantie.