



Goldin – appât pour mouches

Mode d'action

L'appât pour mouches **Goldin** en granulés attire les mouches. Les mouches mangent les granulés et meurent immédiatement après.

Champs d'application

L'appât pour mouches **Goldin** est approprié pour des étables pour animaux de tout genre, locaux de service et de stockage.

Structure chimique

- Azaméthiphos

Utilisation/dosage

Utilisation comme appât à épandre

Utilisez de petits bols en carton, tôle ou matière plastique. Epandre l'appât **Goldin** dans les bols de manière plate – pas de tas – et placez ces bols aux endroits préférés des mouches. Pour obtenir une bonne efficacité, placer des bols à plusieurs endroits. 2'000 g de granulé sont suffisants pour une surface de 1'000 m².

Application par badigeonnement

L'application par badigeonnement s'est relevée particulièrement efficace dans la pratique. Mélangez l'appât pour mouches **Goldin** en proportion de mélange 1:1 (1 g pour 1 ml) avec de l'eau chaude jusqu'à ce que le granulé soit dissout. Appliquez cette solution sur toutes les surfaces appréciées par les mouches (fenêtres, rebords de fenêtre, sources de lumière, poteaux, portes etc.). L'utilisation de plaques en carton, bois, métal ou matière plastique (grandeur DIN A3 ou DIN A4) est particulièrement pratique. Enduit des deux côtés, elles sont suspendues à intervalle de 4 à 5 m.

Sécurité

Premiers secours :

Informations générales: les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident. Après inhalation: arrivée d'air frais, consulter un médecin en cas de troubles. Après contact avec la peau: laver immédiatement à l'eau et au savon. Après contact avec les yeux: rincer abondamment à l'eau pendant 10 à 15 min. en maintenant les paupières écartées, consulter un médecin. Après ingestion: rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Ne faites surtout pas vomir, mais appelez immédiatement un médecin.

Indications:

Dans des exploitations de production laitière, la pulvérisation n'est autorisée que dans des étables vides. Avant le traitement, couvrir soigneusement les aliments pour animaux, installations d'alimentation et d'abreuvement ainsi que les installations de traite et dispositifs d'attache. Les endroits pouvant être atteints par les animaux en léchant ne doivent pas être traités. Ne doit ni être appliqué sur le corps des animaux ni être mélangé au produit pour le blanchissage. Nous déclinons toute responsabilité en rapport avec l'utilisation du produit qui n'est pas soumise à notre influence.

Utiliser les biocides de façon sûre. Avant l'utilisation toujours lire le marquage et l'information sur le produit. Vous trouverez des indications supplémentaires dans la fiche de données de sécurité de Goldin. Il faut tenir compte des indications mentionnées. Cet aide-mémoire a été réalisé selon nos meilleures connaissances et expériences. Nous communiquons ces informations sans garantie.

Etat: 03/2011