

WIRKUNGSSPEKTRUM

Neo-Larventox C ist ein Spezialprodukt gegen Fliegenmaden. Es verhindert das Aufkommen von Stallfliegen, die sich in Gülle, Mist oder Einstreu entwickeln. Das Larvenwachstum wird gehemmt, der Entwicklungszyklus der Insekten unterbrochen, so dass sich große Fliegenpopulationen erst gar nicht entwickeln können. **Neo-Larventox C** wirkt gegen alle Arten von Fliegenstämmen. Bisher sind keine Resistenzen bekannt. Kann auch in belegten Buchten eingesetzt werden. Zum Streuen, Gießen und Spritzen. 5000 g Granulat reichen für 200 qm zu behandelnde Mistfläche.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für Tierställe im landwirtschaftlichen Bereich.

WIRKSTOFF

Cyromazin 20 g/kg

ANWENDUNG/DOSIERUNG

Mit der Behandlung sollte 1-3 Tage nach der Einstallung oder dem Ausmisten begonnen werden. Die Zeiträume zwischen den Behandlungen betragen zunächst 2 Wochen (1. bis 3. Behandlung), danach 4-6 Wochen. Behandelt werden Spaltenböden, Randzonen von Liege- und Laufflächen, Güllekanäle und Schwimmschichten der Gülle. Eine Reinigung ist mit handelsüblichen leicht alkalischen Allzweckreinigern möglich. (1 Messlöffel = 15 g)

Anwendung im Gießverfahren

500 g Granulat in 15 Liter Wasser auflösen und mittels Gießkanne auf ca. 20 m² Mistfläche verteilen.

Anwendung im Spritzverfahren:

500 g Granulat in 5 Liter Wasser auflösen und mittels Rückenspritze auf ca. 20 m² Mistfläche verteilen.

Anwendung im Streuverfahren:

500 g Granulat breitwürfig auf ca. 20 m² Mistfläche streuen.

GEBINDEGRÖSSEN

5 kg Granulatkonzentrat

ERSTE HILFE

Allg. Hinweise: Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mind. 48 Std nach Unfall. Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen. Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lid 10 - 15 min mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt aufsuchen. Gegenmittel: Symptomatische Behandlung

HINWEISE

Tiere, Personen, Futter- und Lebensmittel dürfen nicht berührt werden. Nicht anwenden in Ställen mit kranken oder neugeborenen Tieren. Altbestände und Reste nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren, sondern Sonderabfall-/Problemstoffsammlerstellen übergeben. Leere Verpackungen nicht wiederverwenden, sondern wie beschrieben entsorgen. Eine Haftung in Zusammenhang mit der Produkthanwendung können wir nicht übernehmen, da sie außerhalb unseres Einflusses liegt.