

WIRKUNGSSPEKTRUM

ZIDEX ist ein Spritzmittel-System zur Bekämpfung von Stallfliegen. Es wirkt zuverlässig als Fraß- und Kontaktgift gegen alle Fliegenarten. Auch andere kriechende und fliegende Schadinsekten wie Bremsen, Mücken, Motten usw. werden erfolgreich bekämpft.

ANWENDUNGSBEREICHE

Es eignet sich für alle Arten von Tierstallungen, Scheunen, Vorratsräume, Wirtschaftsräume, Läger usw.

WIRKSTOFFE

ZIDEX G: Cypermethrin, Tetramethrin, Geraniol, Piperonylbutoxid

ZIDEX R: alpha-Cypermethrin, Tetramethrin, Piperonylbutoxid

ZIDEX Y: Permethrin, Tetramethrin, Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt, Geraniol

ANWENDUNG/DOSIERUNG

Verstaubte und verschmutzte Flächen vor der Anwendung säubern. Staub und Schmutz beeinträchtigen den Bekämpfungserfolg erheblich. Den Flascheninhalt in 10 l Wasser verrühren. Die fertige Spritzbrühe mit Rückenspritze und geringem Druck auf allen Flächen ausbringen und keine Stellen auslassen. Der Flascheninhalt von 500 ml reicht für ca. 350 m² Fläche.

Die Wirkung tritt innerhalb von 30 Minuten ein. Bei der Ausbringung und für die nächsten 24 Stunden ist für eine gute Stalldurchlüftung zu sorgen. Anwendungshäufigkeit üblicherweise alle 3-4 Wochen, je nach Bedarf auch häufiger. Eine Reinigung ist mit handelsüblichen leicht alkalischen Allzweckreinigern möglich.

Um eine mögliche Resistenz der Fliegen auszuschalten, sollten Sie andere Wirkstoffkombinationen einsetzen und somit zwischen **ZIDEX G, R** und **Y** wechseln.

GEBINDEGRÖSSEN

500 ml Flasche Flüssigkonzentrat

ERSTE HILFE

Allg. Hinweise: Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mind. 48 Std nach Unfall. Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen. Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lid 10 - 15 min mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt aufsuchen.
Gegenmittel: symptomatische Behandlung

HINWEISE

Tiere, Personen, Futter- und Lebensmittel dürfen nicht berührt werden. Nicht anwenden in Ställen mit kranken oder neugeborenen Tieren. Altbestände und Reste nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren, sondern Sonderabfall-/Problemstoffsammlerstellen übergeben. Leere Verpackungen nicht wiederverwenden, sondern wie beschrieben entsorgen. Nicht auf Acrylglas-Leitungen und Styroporteile sprühen. Eine Haftung in Zusammenhang mit der Produkthanwendung können wir nicht übernehmen, da sie außerhalb unseres Einflusses liegt.