



# ZIDEX G produit à pulvériser pour étables

## Spectre d'action

**ZIDEX G** est un produit à pulvériser pour la lutte contre les mouches d'étable et les ectoparasites. Il agit efficacement par contact et ingestion contre toutes les espèces de mouches. Ce produit combat également de manière fiable les autres insectes volants et rampants comme par exemple les poux rouges des volailles, acariens de la gale, tiques etc.

## Champs d'application

Il convient parfaitement pour toutes les sortes d'étable, granges, locaux d'entreposage, locaux de service, stocks etc.

## Structure chimique

- ZIDEX G: Cyperméthrine

## Utilisation/dosage

Avant l'utilisation, nettoyer les surfaces poussiéreuses et sales. La poussière et la saleté altèrent considérablement l'efficacité de la lutte. Délayer le contenu du flacon dans 10 l d'eau. Epancher le produit prêt à l'emploi à l'aide d'un pulvérisateur à dos à faible pression sur toutes les surfaces, sans omettre des endroits. Le contenu du flacon de 500 ml est suffisant pour une surface d'environ 350 m<sup>2</sup>.

L'effet apparaît dans les 30 minutes. Lors de l'épandage et pendant les prochaines 24 heures, veiller à bien aérer l'étable. Fréquence de l'utilisation: habituellement toutes les 3-4 semaines, mais aussi plus fréquemment si nécessaire. Le nettoyage peut se faire à l'aide d'un nettoyant universel légèrement alcalin.

Dans des exploitations de production laitière, la pulvérisation n'est autorisée que dans des étables vides. Avant le traitement, couvrir soigneusement les aliments pour animaux, installations d'alimentation et d'abreuvement ainsi que les installations de traite et dispositifs d'attache. Les endroits pouvant être atteints par les animaux en léchant ne doivent pas être traités. Ne doit ni être appliqué sur le corps des animaux ni être mélangé au produit pour le blanchissage.

## Sécurité

Traitement adéquat: traitement symptomatique

### Premiers secours :

**Informations générales:** les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident. **Après inhalation:** arrivée d'air frais, consulter un médecin en cas de troubles. **Après contact avec la peau:** laver immédiatement à l'eau et au savon. **Après contact avec les yeux:** rincer abondamment à l'eau pendant 10 à 15 min. en maintenant les paupières écartées, consulter un médecin. **Après ingestion:** rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Ne faites surtout pas vomir, mais appelez immédiatement un médecin.

**Indications :** les animaux, personnes, produits alimentaires et aliments pour animaux ne doivent pas entrer en contact avec le produit. Ne pas l'utiliser dans des étables avec animaux malades ou nouveau-nés. Ne pas jeter les stocks périmés et restes avec les déchets ménagers. Ne pas verser les restes dans l'évier ou le WC, mais les remettre à la collecte de déchets spéciaux/matières à risque. Ne pas réutiliser des emballages vides, mais les éliminer comme indiqué ci-dessus. Ne pas pulvériser sur des conduites en verre acrylique ou des pièces en polystyrène. Nous déclinons toute responsabilité en rapport avec l'utilisation du produit qui n'est pas soumise à notre influence.

*Utiliser les biocides de façon sûre. Vous trouverez des indications supplémentaires dans la fiche de données de sécurité de ZIDEX. Il faut tenir compte des indications mentionnées.*

*Cet aide-mémoire a été réalisé selon nos meilleures connaissances et expériences. Nous communiquons ces informations sans garantie.*

Etat: 05/2011